

## Le Semi-Apollon

(LINNAEUS – 1758)

Nombre de données par département

04	05	06	13	83	84	PACA
103	199	63	5	60	-	430

**Habitat :** lisières et clairières ensoleillées, bordures de hêtraie ou d’aulnaie, reposoirs à bétail, voisinage des chalets d’alpage, de 700 à 2 400 m.

**Phénologie :** vol de début mai à août en une génération.


**Plantes-hôtes :** corydalis, avec pour PACA les deux principales espèces : la Corydale intermédiaire (*Corydalis intermedia* (L.) Mérat) et la Corydale à bulbe plein (*Corydalis solida* (L.) Clairv.). La Corydale creuse (*Corydalis cava* (L.) Schweigg. & Körte) est beaucoup plus rare sur la région.

**Observations :** M. Napolitano a effectué en 1989 une étude biométrique et électrophorétique qui a permis de diviser l’ensemble des populations françaises en six groupes. Le groupe le plus caractéristique est la sous-espèce *cassiensis* du massif de la Sainte-Baume.

**Menaces :** la régression de cette espèce est vraisemblablement multifactorielle et probablement cumulative (Deschamp-Cottin *et al.*, 1999) : fermeture des milieux (abandon du pâturage), réchauffement climatique et isolement des populations (manque de brassage génétique).



Malheureusement, la sous-espèce *cassiensis* est en voie de disparition. Il ne subsiste qu’une petite station dans la partie varoise du massif de la Sainte-Baume sur les quatre connues historiquement. Le Semi-Apollon ne fait plus partie de la faune des Bouches-du-Rhône.



Statut de protection	N, E, (b2, dh4)
Programme national de restauration	B

Répartition altitudinale

